

## Quiste pleuropericárdico en adulto Pleuropericardial cyst in adult

Yanet Díaz-García<sup>1\*</sup> <https://orcid.org/0000-0003-2391-6604>

Yamila Caraballo-Berrío<sup>1</sup> <https://orcid.org/0000-0002-2581-5797>

Dianelys Ortega-Pérez<sup>2</sup> <https://orcid.org/0000-0001-5049-6807>

<sup>1</sup>Especialista de Primer Grado en Neumología y Medicina General Integral. Profesora Auxiliar. Hospital General Provincial Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”. Ciego de Ávila, Cuba.

<sup>2</sup>Especialista de Primer Grado en Neumología y Medicina General Integral. Profesora Asistente. Hospital General Provincial Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”. Ciego de Ávila, Cuba.

\*Autor para la correspondencia. Correo electrónico: [yanet74@infomed.sld.cu](mailto:yanet74@infomed.sld.cu)

Recibido: 02/11/2019

Aprobado: 09/03/2020

Se presentan dos radiografías de tórax y una imagen de tomografía axial computarizada de alta resolución (TACAR) contrastada de un quiste pleuropericárdico derecho (Fig. 1). En el panel A se observa la radiografía simple de tórax, en vista posteroanterior, con opacidad redondeada paracardiaca derecha y en el panel B, la vista lateral derecha con la opacidad que borra la silueta cardiaca (signo de Felson positivo). En el panel C, con el corte tomográfico, se constata la lesión de aspecto quística

(quiste lleno) en íntimo contacto con el pericardio. Se trata de una mujer de 42 años con antecedentes de salud anterior que ingresa por cuadro neumónico con mejoría clínica posterior al tratamiento antibiótico y persistencia del patrón radiológico. La tomografía axial computarizada de alta resolución confirmó la presencia de un gran quiste pleuropericárdico lleno. La paciente se mantiene en seguimiento clínico- radiológico continuo.

El quiste pleuropericárdico es una lesión poco común (incidencia de 1 x 100000 casos). Su hallazgo suele ser incidental y su curso asintomático, aunque puede complicarse por la compresión de estructuras adyacentes, infección o hemorragia del propio quiste. El tratamiento es conservador, la intervención quirúrgica se realiza sólo en casos sintomáticos o complicados.



**Panel A:** Opacidad redondeada paracardiaca derecha proyección anterior.



**Panel B:** Opacidad redondeada de aspecto quístico en íntimo contacto con pericardio.



**Panel C:** Tomografía axial computarizada de alta resolución

**Fig. 1** - Quiste pleuropericárdico derecho

### Conflictos de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses.

### Contribuciones de los autores

Yanet Díaz-García: gestación de la idea, revisión de la literatura, atención a la paciente, redacción del



artículo y aprobación de su versión final.

Yamila Caraballo-Berrío: revisión de la literatura, atención a la paciente y aprobación de la versión final del artículo.

Dianelys Ortega-Pérez: revisión de la literatura, atención a la paciente y aprobación de la versión final del artículo.

### **Financiación**

Hospital General Provincial Docente “Dr. Antonio Luaces Iraola”

